

ЕВІСЦЕРАЦІЯ ТАЗА У ХВОРИХ НА РОЗПОВСЮДЖЕННІ ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРИ

***Кононенко М.Г., Андрющенко В.В., Шкурко С.К., Сумцов Д.Г.
СумДУ, медичний інститут, кафедра хірургії з дитячою хірургією
та курсом онкології
Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер***

Більш ніж у третини хворих з новотворами шийки матки, вульви, піхви й колоректальним раком відзначається переважно місцево розповсюджений ріст і відносно рідке метастазування у віддалені органи, а так само досить часте виникнення рецидивів після лікування. Все це спонукало до створення ультрарадикальної операції - евісцерації (екзентерації) органів малого таза (Brunschwig, 1946). По дійсний момент ця операція залишається непопулярною через високу частоту ускладнень, що коливається від 32 % до 84 % і залежить від технічної модифікації.

З 1996 р. по 2004 р. на базі Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру проведено 7 операцій евісцерації органів таза в різних модифікаціях. З них проведено тотальних евісцерацій органів таза - 2, передніх - 4 і задня - 1. Показанням для операції у 4 пацієнток була карцинома шийки матки (у всіх 4 рецидив), і по 1 - саркома тіла матки, карциноми піхви й прямої кишки. У всіх хворих відзначалося проростання пухлин у прилеглі органи й в 4 (57 %) до операції було діагностовано порушення пасажу сечі із нирок. Вік пацієнток коливався від 32 до 62 років (середній вік склав - 47,3 роки). Відведення сечі було проведено у відносно ізольований сегмент сигмовидної кишки за Chardi або в іліоцекальний сегмент по Bricker з формуванням ентероуріностомі. Тривалість операції в середньому склала 7,2 години.

Ускладнення в післяопераційному періоді відзначені у 42 % випадків. Тривалість життя після операції в 4 пацієнток склала від 5 до 8 місяців (у середньому 6,5 місяців), 2 пацієнтки живі дотепер - тривалість життя 6 і 9 років, 1 пацієнтка вибула з-під спостереження. Вживання більше 5 років відзначена у 33 % хворих.

Таким чином, при місцеворозповсюджених пухлинах малого таза евісцерація є єдиним, а при рецидивних формах - другим шансом радикального лікування даної категорії хворих.